



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Carminativum Hofmann's®



Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie:

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Zusammensetzung

100 ml Suspension enthalten:

Polysiloxan-Emulsion, Gereinigtes Wasser, Aroma (natürliche Auszüge aus Kamille, Kümmel, Pfefferminze), Kaliumsorbat (E202), Citronensäure.

25 Tropfen enthalten als wirksamen Bestandteil 195,8 mg Simeticon.

ohne Kristallzucker oder Süßungsmittel, glutenfrei, laktosefrei

Darreichungsform

Suspension zum Einnehmen

Packung mit 30 ml Carminativum Hofmann's®



Hersteller

Hofmann & Sommer GmbH & Co. KG

Lindenstr. 11

07426 Königsee

Tel.: 036738 6590

Fax: 036738 659119

E-Mail: kontakt@hofmannundsommer.de

Anwendungsgebiete

- Zur Behandlung von übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich wie Blähungen, Völlegefühl und Aufstoßen
- Zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen im Bauchbereich (Endoskopie, Ultraschall, Röntgen)
- Zur Behandlung von allgemeinen Verdauungsstörungen

Gegenanzeigen

Carminativum Hofmann's® darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Simeticon oder Kaliumsorbat sind.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Carminativum Hofmann's®.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit ihr Arzt Carminativum Hofmann's® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anleitung, da Carminativum Hofmann's® sonst nicht richtig wirken kann.

Bitte achten Sie darauf, dass Carminativum Hofmann's® vor Gebrauch kräftig geschüttelt werden muss! Halten Sie die Flasche bitte beim Tropfen senkrecht!

Zur Anwendung von gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden:

Nehmen Sie 3 bis 4mal täglich eine Einzeldosis Carminativum Hofmann's® zu oder nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen, unverdünnt oder mit etwas Flüssigkeit ein.

Alter:	Einzeldosis:
3-14 Jahre	12 Tropfen
Jugendliche und Erwachsene	25 Tropfen

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden. Carminativum Hofmann's® kann, falls erforderlich, auch über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.

Die Vorbereitung für diagnostische Untersuchungen im Bauchbereich erfolgt nach Anweisung des Arztes. Die übliche Dosierung ist:

Am Tag vor der Untersuchung:	3mal täglich 15 Tropfen (entspricht 3x 117,5 mg Simeticon)
Am Morgen des Untersuchungstages:	25 Tropfen (entspricht 195,8 mg Simeticon)

Nebenwirkungen


Nebenwirkungen bei der Anwendung von Carminativum Hofmann's® wurden bisher nicht beobachtet. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie doch Nebenwirkungen bei sich bemerken.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen sind bisher nicht bekannt.


Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit

Bei neu auftretenden oder länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine unter Umständen zugrunde liegende behandlungsbedürftige Erkrankung festgestellt werden kann.

 Sie dürfen das Produkt nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nach Anbruch ist diese Packung maximal 3 Monate zu benutzen.

Lagerung

 30 °C Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Nicht über 30 °C lagern.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet:

Januar 2013

Ergänzende Informationen

Carminativum Hofmann's® enthält den Wirkstoff Simeticon. Es bewirkt, dass schaumartige Blasen im Magen-Darm-Trakt sofort zerfallen und somit ganz natürlich abtransportiert werden können. Dabei wird der Wirkstoff nicht vom Körper aufgenommen, sondern verlässt diesen unverändert. Carminativum Hofmann's® ist daher sehr gut verträglich, so dass es zum längeren Gebrauch geeignet ist und auch in der Schwangerschaft und von Kindern angewendet werden kann.